Suites géométriques (2)

Exercice 1 :

1. Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q .

Calculer q et u_0 sachant que : $u_3 = \frac{3}{2}$ et $u_9 = 96$.

2. Soit (v_n) une suite géométrique de premier terme v_0 et de raison $q=3$ telle que

$$v_1 + v_2 + \dots + v_n = 242.$$

a) Exprimer v_n en fonction de n .

b) Calculer $S = \frac{2}{3} + 2 + 6 + \dots + 1458$.

Exercice 2 :

Soit a , b et c trois termes consécutifs d'une suite géométrique (u_n) de raison non nulle q telle que : $abc = 216$ et $b+c = 15$.

1. Déterminer les réels b et q .

2. En déduire les réels a et c .

3. Soit a le premier terme de la suite (u_n) . Montrer que $v_n = \frac{3^n}{2^{n-2}}$.

Exercice 3 :

Soit (u_n) une suite géométrique de raison $\frac{3}{2}$ et de premier terme $u_0 = 4$.

1. a) Calculer la valeur du quatrième terme de la suite (u_n) .

b) Exprimer, en fonction de n , u_n et $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

2. Soit (v_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = u_n + n$.

a) Calculer v_0 , v_1 et v_2 .

b) Montrer que la suite (v_n) n'est pas arithmétique.

c) Exprimer $A_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$ en fonction de n .

Suites géométriques (2)

Exercice 4 :

Soit (u_n) la suite définie par : $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 2u_n - 3$.

1. Calculer u_1 et u_2 .
2. La suite (u_n) est elle arithmétique ? est elle géométrique ? Justifier.
3. Soit (v_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = u_n - 3$.
Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison.
4. Calculer le réel $S = u_0 + u_1 + \dots + u_9$.

Exercice 5:

A- Soit (u_n) la suite arithmétique telle que $u_5 = -12$ et $u_{12} = -40$.

1. Calculer la raison de la suite (u_n) .
2. Vérifier que pour tout entier n , $u_n = 8 - 4n$.
3. Calculer $S = -12 - 16 - 20 - \dots - 80$.

B- Soit la suite (v_n) définie par : $v_0 = -3$ et pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n + n$.

1. Calculer v_1 et v_2 .
2. Vérifier que la suite (v_n) n'est ni arithmétique, ni géométrique.

C- Soit la suite (w_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $w_n = 2v_n + u_n$.

1. Montrer que (w_n) est une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$.
2. Exprimer w_n puis v_n en fonction de n .
3. On pose pour tout n de $\mathbb{N}^*$, $S_n = v_1 + v_2 + \dots + v_n$. Montrer que $S_n = n^2 - 3n + 1 - \frac{1}{2^n}$.

Suites géométriques (2)

Exercice 1 :

1. Soit (u_n) une suite géométrique de premier terme u_0 et de raison q .

On sait que $u_3 = u_0 \cdot q^3$ et $u_9 = u_0 \cdot q^9$, il en suit : $\frac{u_9}{u_3} = q^6$.

Or $\frac{u_9}{u_3} = 96 \times \frac{2}{3} = 64$ donc $q^6 = 64$.

Et comme $2^6 = 64$ alors $q = 2$ ou $q = -2$.

✓ Si $q = 2$:

$$u_3 = u_0 \times q^3 \text{ équivaut à } 8u_0 = \frac{3}{2} \text{ équivaut à } u_0 = \frac{3}{16}.$$

✓ Si $q = -2$:

$$u_3 = u_0 \times q^3 \text{ équivaut à } -8u_0 = \frac{3}{2} \text{ équivaut à } u_0 = -\frac{3}{16}.$$

2. Soit (v_n) une suite géométrique de premier terme v_0 et de raison $q = 3$ telle que

$$v_1 + v_2 + v_3 + v_4 + v_5 = 242.$$

a) On sait que $v_1 + v_2 + v_3 + v_4 + v_5 = v_1 \frac{1-3^5}{1-3} = 121v_1$ et comme

$$v_1 + v_2 + v_3 + v_4 + v_5 = 242, \text{ alors } 121v_1 = 242 \text{ d'où } v_1 = 2.$$

$$\text{Or } v_1 = q \times v_0 = 3v_0 \text{ donc } 3v_0 = 2 \text{ ou encore } v_0 = \frac{2}{3}.$$

$$\text{Ainsi, pour tout entier naturel } n, v_n = v_0 \cdot q^n = \frac{2}{3} \times 3^n = 2 \times 3^{n-1}.$$

b) On remarque que : $v_0 = \frac{2}{3}$, $v_1 = 2 \times 3^0 = 2$, $v_2 = 2 \times 3 = 6, \dots$

$$\text{D'autre part } 1458 = 2 \times 3^6 = 2 \times 3^{7-1} = v_7.$$

$$\text{Il en résulte : } S = v_0 + v_1 + v_2 + \dots + v_7 = v_0 \frac{1-q^8}{1-q} = \frac{2}{3} \cdot \frac{1-3^8}{1-3} = \frac{3^8-1}{3} = \frac{6560}{3}$$

Exercice 2 :

Soit a, b et c trois termes consécutifs d'une suite géométrique (u_n) de raison non nulle q telle que : $abc = 216$ et $b+c=15$.

1. On a d'une part : $a = \frac{b}{q}$ et $c = bq$ donc $abc = b^3$ et d'autre part $abc = 216$ d'où

$$b^3 = 216. \text{ Or } 216 = 6^3, \text{ par suite } \mathbf{b = 6}.$$

Suites géométriques (2)

Comme $b + c = 15$ et $c = b \cdot q$ alors $b + bq = 15$ ou encore $6 + 6q = 15$ d'où $q = \frac{3}{2}$.

2. On en déduit que : $a = \frac{b}{q} = 6 \times \frac{2}{3} = 4$ et $c = bq = 6 \times \frac{3}{2} = 9$.

3. Si $a = 4$ est le premier terme de la suite (u_n)

alors $v_n = 4 \times q^n = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n = 4 \times \frac{3^n}{2^n} = \frac{3^n}{2^{n-2}}$.

Exercice 3 :

Soit (u_n) une suite géométrique de raison $\frac{3}{2}$ et de premier terme $u_0 = 4$.

1. a) Le quatrième terme de la suite (u_n) est $u_3 = u_0 \times q^3 = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^3 = 2 \times 27 = 108$.

b) Pour tout entier naturel n , $u_n = 4 \times \left(\frac{3}{2}\right)^n = \frac{3^n}{2^{n-2}}$

et $S_n = u_0 + u_1 + \dots + u_n = 4 \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} = 8 \left[\left(\frac{3}{2}\right)^{n+1} - 1 \right] = \frac{3^{n+1}}{2^{n-2}} - 8$.

2. Soit (v_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = u_n + n$.

a) $v_0 = u_0 = 4$, $v_1 = u_1 + 1 = 7$ et $v_2 = u_2 + 2 = 11$.

b) $v_0 + v_2 = 15 \neq 14 = 2 \times v_1$ donc la suite (v_n) n'est pas arithmétique.

c) Pour tout entier n , $A_n = v_0 + v_1 + \dots + v_n$

$$\begin{aligned} &= (u_0 + 0) + (u_1 + 1) + \dots + (u_n + n) \\ &= (u_0 + u_1 + \dots + u_n) + (0 + 1 + \dots + n) \\ &= \frac{3^{n+1}}{2^{n-2}} - 8 + \frac{n(n+1)}{2} \end{aligned}$$

Exercice 4 :

Soit (u_n) la suite définie par : $u_0 = 1$ et pour tout entier naturel n , $u_{n+1} = 2u_n - 3$.

1. $u_1 = 2u_0 - 3 = -1$ et $u_2 = 2u_1 - 3 = -5$.

Suites géométriques (2)

2. Comme $u_0 + u_2 = -4 \neq 2u_1 = -2$ alors la suite (u_n) n'est pas arithmétique.

On a aussi : $u_0 \times u_2 = -5 \neq u_1^2 = 1$ donc la suite (u_n) n'est plus géométrique.

3. Soit (v_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$ par $v_n = u_n - 3$.

Pour tout entier n , $v_{n+1} = u_{n+1} - 3 = 2u_n - 6 = 2(u_n - 3) = 2v_n$. Il en résulte que la suite (v_n) est géométrique de raison 2.

$$\begin{aligned} 4. S &= u_0 + u_1 + \dots + u_9 = (v_0 + 3) + (v_1 + 3) + \dots + (v_9 + 3) \\ &= (v_0 + v_1 + \dots + v_9) + \left(3 + 3 + \dots + 3\right) = v_0 \left(\frac{1-2^{10}}{1-2}\right) + 30. \\ &= -2(2^{10} - 1) + 30 = -2016 \end{aligned}$$

Exercice 5:

A- Soit (u_n) la suite arithmétique telle que $u_5 = -12$ et $u_{12} = -40$.

1. Soit r la raison de cette suite arithmétique (u_n) .

On sait que $u_{12} = u_5 + 7r$ donc $7r = -28$ d'où $r = -4$.

2. Soit u_0 le premier terme de (u_n) .

On sait que : $u_5 = u_0 + 5r$ donc $u_0 = u_5 - 5r = -12 + 20 = 8$

Ainsi, pour tout entier n , $u_n = u_0 + r n = 8 - 4n$.

3. Soit $S = -12 - 16 - 20 - \dots - 80$.

Remarquons que : $-12 = u_5$, $-16 = -12 - 4 = u_6$, $-20 = -16 - 4 = u_7, \dots$,

D'autre part : $-80 = -8 - 72 = -8 + (-4) \times 18 = u_{18}$.

Il en résulte que $S = (18 - 5 + 1) \frac{u_5 + u_{18}}{2} = 7 \times (-92) = -644$.

B- Soit la suite (v_n) définie par : $v_0 = -3$ et pour tout entier naturel n , $v_{n+1} = \frac{1}{2}v_n + n$.

$$1. v_1 = \frac{1}{2}v_0 + 0 = -\frac{3}{2} \text{ et } v_2 = \frac{1}{2}v_1 + 1 = \frac{1}{4}.$$

$$2. \text{ On a : } v_0 + v_2 = -\frac{11}{4} \neq -3 = 2v_1 \text{ et } v_0 \times v_2 = -\frac{3}{4} \neq \frac{9}{4} = v_1^2.$$

Donc la suite (v_n) n'est ni arithmétique, ni géométrique.

C- Soit la suite (w_n) définie sur $\mathbb{N}$ par : $w_n = 2v_n + u_n$.

1. Pour tout entier naturel n ,

Suites géométriques (2)

$$\begin{aligned}w_{n+1} &= 2v_{n+1} + u_{n+1} = v_n + 2n + 8 - 4(n+1) \\ &= v_n - 2n + 4 = \frac{1}{2}(2v_n + 8 - 4n) = \frac{1}{2}(2v_n + u_n) = \frac{1}{2}w_n\end{aligned}$$

Donc (w_n) une suite géométrique de raison $\frac{1}{2}$.

2. Pour tout entier naturel n , $w_n = w_0 \times \left(\frac{1}{2}\right)^n = (2v_0 + u_0) \times \frac{1}{2^n} = 2 \times \frac{1}{2^n} = \frac{1}{2^{n-1}}$

D'où $v_n = \frac{1}{2}(w_n - u_n) = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2^{n-1}} - (8 - 4n)\right) = \frac{1}{2^n} - 4 + 2n$.

3. Pour tout n de $\mathbb{N}^*$,

$$\begin{aligned}S_n &= v_1 + v_2 + \dots + v_n \\ &= \frac{1}{2}[(w_1 - u_1) + (w_2 - u_2) + \dots + (w_n - u_n)] \\ &= \frac{1}{2}[(w_1 + w_2 + \dots + w_n) - (u_1 + u_2 + \dots + u_n)] \\ &= \frac{1}{2} \left[w_1 \times \frac{1 - \left(\frac{1}{2}\right)^n}{1 - \frac{1}{2}} - n \left(\frac{u_1 + u_n}{2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[2 \left(1 - \frac{1}{2^n} \right) - n \left(\frac{12 - 4n}{2} \right) \right] \\ &= \frac{1}{2} \left[2 \left(1 - \frac{1}{2^n} \right) - n(6 - 2n) \right] \\ &= n^2 - 3n + 1 - \frac{1}{2^n}\end{aligned}$$